



Träckprovsanalys NÖT

KONTAKTUPPGIFTER Fakturauppgifter hämtas från Gård&Djurhälsans medlemsregister genom erat SE-nummer

.....
Namn

.....
Adress

.....
Postnummer

.....
Ort

.....
Telefonnummer

.....
Provtagningsdatum åååå-mm-dd

.....
SE-nummer

.....
E-post *Texta tydligt. Vi svarar normalt ut via E-post.*

.....
Beställarens underskrift

.....
Beställarens personnr./organisationsnr. ååmmdd-xxxx

INFORMATION OM DJUREN

Prov från:

- Kalvar på stall, yngre än tre månader
- Förstagångsbetare, dikalvar/amkalvar
- Förstagångsbetare, avvanda kalvar/ungdjur
- Andragångsbetare, ungdjur
- Vuxna djur
- Ej nötkreatur, ange:

Övriga uppgifter

(anledning till provtagning, ev. gruppering av prover mm):

.....

.....

.....

.....

.....

ANALYSER Kryssa för önskade analyser

Grundanalys Kvantitativ räkning av ägg från mag-/tarmparasiter (EPG) och koccidier (OPG).

- Grundanalys av grupp** *Proverna analyseras tre och tre.*
 - Grundanalys av individ**
-
-
-

TILLÄGGSANALYSER

Provtagning är godkänd av Gård&Djurhälsans veterinär.
Ange datum och veterinärens namn:

.....

- Leverflundra**
- Lungmask**
- ODLING** för påvisande av Ostertagia/Cooperia
- Övrigt:

Se villkor på www.vidilab.se/prislista

FYLLS I AV LABORATORIET

PROV-ID Märkning

(Plats för laboratoriets etikett) X

PROV-ID Märkning

(Plats för laboratoriets etikett) X

PROV-ID Märkning

(Plats för laboratoriets etikett) X

PROV-ID Märkning

(Plats för laboratoriets etikett) X

PROV-ID Märkning

(Plats för laboratoriets etikett) X

PROV-ID Märkning

(Plats för laboratoriets etikett) X

Instruktion för träckprovstagning

Den mest lämpliga provtagningstiden är 4–6 veckor efter betessläpp, men kan behöva anpassas efter gårdens förutsättningar, exempelvis efter åldern på kalvarna. Prata med din veterinär för mer information. Vid misstanke om beteskoccidios (*E. alabamensis*) är lämplig provtagningstid tre dagar efter att diarrén debuterat, ofta ca tio dagar efter betessläpp.

För ett säkert och snabbt svar

1. Ta endast träck från ett djur per påse. Ta ca 3 matskedar träck per djur, ca 5 matskedar om individuella och/eller tilläggsanalyser önskas (från ändtarmen eller färskt = kroppsvarm spillning från marken).
2. En grundanalys får innehålla träck från max tre djur. Märk påsarna som ingår i gruppen med samma siffra t.ex. 1, 1 och 1. Använd en penna med beständig skrift.
3. Lägg sedan alla påsarna i en yttre plastpåse för att förhindra läckage. Om proverna är mycket lösa, använd plastburkar med tättslutande lock.
4. Om andra analyser än grundanalysen är aktuella, fyll i det i avsedda kryssrutor.
5. En rätt och tydligt ifyllt följesedel gör att vi snabbt och effektivt kan behandla provet på labbet. I första hand svarar vi ut via e-post. Kontrollera din e-post kontinuerligt. Kontrollera även skräppostmappen.
6. Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvert. Har du inte möjlighet att posta på provtagningsdagen så förvara provet i kylskåp (får ej frysa) och posta dagen efter. För att ge ett tillförlitligt resultat får träckprovet vara max fem dagar gammalt vid ankomst till laboratoriet.
7. Skicka provet lämpligast måndag eller tisdag för att undvika eventuella förseningar i postgången.
8. Skickas till: **Vidilab AB, Box 33, 745 21 ENKÖPING. Telefon: 0171-44 12 60.**
OBS! Ej rådgivning eller tolkning av provsvar!

Provsvaret

Grundanalysen genomförs i regel samma dag som provet kommer till laboratoriet. Vissa analyser tar mer än en dag att utföra och svaras ut när analysen är klar. Tveka inte att kontakta laboratoriet för besked, helst via e-post på provsvaret@vidilab.se